

モスバリアジュニアⅡ レッド 効果的な使用方法

★効果について

赤色の効果は拡散抑制です。農薬のような殺傷効果はありません。

アザミウマは生息域を広げるため(拡散)、緑色(作物)を目標に飛ぶと言われています。作物に赤色が当たると、目標が見えなくなりその場に留まり拡散しにくくなります。

★効果を得るため大切なこと

照射開始前のハウスのアザミウマ密度をゼロにする。

露地でも点灯前に農薬散布等でアザミウマを防除しておく。

種まき・定植直後から点灯し、最後まで継続して点灯する。

アザミウマが活動する時間に点灯。

苗と共にアザミウマが持ち込まれないよう注意する。

天敵農薬との併用や必要に応じて農薬散布する。

★点灯時間


ミナミキイロアザミウマの飛翔活動は、夏場は明け方と夕方の数時間、冬場は昼間が最も活発となります。(農研機構 光を利用した害虫防除の手引きより)

他の種類も昼間活動します。

以下の時間を厳守してください。

季節による時間の変化に注意し、タイマー設定時間を適切に。

●日の出1時間前～日の入り1時間後の照射が望ましい。



※夜間に照射すると、アザミウマ類を誘引する。

★天敵農薬への影響

カブリダニ類等の天敵(甲虫など)に対する影響はありません。

★反射シートの併用

光がまんべんなくあたることで効果を高められます。

光を反射させるシートを併用することで効果が高くなります。

